

Soluciones y comprobación

La operación iniciada con apoyo es la número 1 de la práctica. Revisa primero el procedimiento; una respuesta distinta no indica por sí sola dónde estuvo el error.

1 $36 : 3 = 12$; resto 0

Prueba: $3 \times 12 + 0 = 36$; $0 < 3$.

2 $80 : 5 = 16$; resto 0

Prueba: $5 \times 16 + 0 = 80$; $0 < 5$.

3 $36 : 2 = 18$; resto 0

Prueba: $2 \times 18 + 0 = 36$; $0 < 2$.

4 $44 : 4 = 11$; resto 0

Prueba: $4 \times 11 + 0 = 44$; $0 < 4$.

5 $66 : 6 = 11$; resto 0

Prueba: $6 \times 11 + 0 = 66$; $0 < 6$.

6 $84 : 7 = 12$; resto 0

Prueba: $7 \times 12 + 0 = 84$; $0 < 7$.

¿Por qué no puedes saltarte una cifra cero que aparezca dentro del cociente?

El cero conserva una posición sin unidades de ese orden. Al quitarlo cambiarían las posiciones de las otras cifras y el valor del cociente.

Para volver a intentarlo

Compara una sola columna con el ejemplo. Revisa la posición de las cifras, la operación de esa columna y lo que llevas a la siguiente. Corrige ese paso y repite la comprobación. Puedes crear otra ficha del mismo nivel cuando comprendas el cambio.